



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Абдиев М.К.
«15»  2020г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГЕРБИОН® СИРОП ПЕРВОЦВЕТА

Торговое наименование
Гербион® сироп первоцвета

Международное непатентованное наименование
Нет

Лекарственная форма
Сироп

Описание
Сироп коричневого цвета со специфическим запахом, допускается наличие небольшой опалесценции.

Состав
5 мл сиропа содержит:
активные вещества: 1 экстракт жидкой водной смеси первоцвета весеннего корней и тимьяна обыкновенного травы 3,08 г;
вспомогательные вещества: левоментол, сахароза, метилпарагидроксибензоат (E218).
1 Экстракт жидкой водной смеси первоцвета весеннего корней и тимьяна обыкновенного травы приготовлен из: первоцвета весеннего корней (*Primula veris L.*, сем. первоцветные – *Primulaceae*) 0,22 – 0,51 г; тимьяна обыкновенного травы (*Thymus vulgaris L.*, сем. яснотковые – *Lamiaceae*) 0,62 г; воды очищенной (экстрагент).

Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний. Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами. Отхаркивающие препараты. Комбинация отхаркивающих препаратов.
Код АТХ: R05CA10

Фармакологические свойства
Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным действием; способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему ее отхождению.

Показания к применению
Препарат применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии

воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит, трахеобронхит).

Режим дозирования и способ применения

Внутрь, препарат рекомендуется принимать, запивая достаточным количеством теплой воды.

Перед употреблением взбалтывать.

Взрослым рекомендуется принимать по 3 мерные ложки (1 мерная ложка - 5 мл) 3-4 раза в сутки после еды.

Детям в возрасте от 2 до 5 лет - по 1/2 мерной ложки 3 раза в сутки после еды.

Детям в возрасте от 5 до 14 лет – по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки после еды.

Детям старше 14 лет – по 2 мерных ложки (10 мл) сиропа 3-4 раза в сутки.

Длительность курса терапии - 2-3 недели. Увеличение длительности или проведение повторного курса лечения возможно после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к препаратам, содержащим активные вещества семейства первоцветные и семейства яснотковые; дети после перенесенного острого обструктивного ларингита (круп); бронхиальная астма, сахарный диабет; наследственная непереносимость фруктозы; синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы и врожденная недостаточность сахаразы-изомальтазы; детский возраст до 2-х лет.

Нежелательные реакции

Возможны аллергические реакции. Возможны в очень редких случаях: тошнота, рвота, диарея. В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Особые указания и меры предосторожности

В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 3,15 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 3,15 г (1 мерная ложка – 5 мл, что соответствует 0,315 хлебным единицам) до 9,45 г (3 мерных ложки – 15 мл, что соответствует 0,945 хлебным единицам) сахарозы.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у указанной группы пациентов).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Гербион[®] сироп первоцвета не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с другими сложными техническими устройствами, требующую повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Гербион[®] сироп первоцвета не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки препарата не поступало.

В случае передозировки сапонинсодержащих препаратов, возможны желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей.

Лечение: симптоматическое.

Форма выпуска

Сироп.

По 150 мл сиропа во флаконе из темного стекла (тип III), укупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия.

1 флакон помещают в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой мерной ложкой и инструкцией по применению.

Срок годности

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Не хранить в холодильнике.

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Упаковщик

КРКА, д.д., Ново место, Повхова улица 5, 8501 Ново место, Словения

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Кыргызской Республики:

Офис представительства КРКА, д.д., Кыргызская Республика, г. Бишкек

Телефон: +(996) 312 662 250

Электронная почта: pharmacovigilance.KG@krka.biz