Министрлигинин алдындагы Дары каражаттары
жана медициналык буюмдар департаменти
Дары каражаттарын каттоо башкармалыгы
Департамент лекарственных средств
медицинских изделий при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики
Управление регистрации лекарственных средств
«29» 07 2026 г.
от 02.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Налгезин, 275 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Действующее вещество: напроксен

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Налгезин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Налгезин.
3. Прием препарата Налгезин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Налгезин.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Налгезин, и для чего его применяют

Препарат Налгезин содержит действующее вещество – напроксен.

Препарат относится к фармакотерапевтической группе: противовоспалительные и противоревматические препараты; нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты; производные пропионовой кислоты.

Показания к применению

Препарат Налгезин применяется у взрослых и подростков в возрасте от 15 лет для лечения:

- заболеваний опорно-двигательного аппарата (ревматическое поражение мягких тканей, остеоартроз периферических суставов и позвоночника, в том числе с радикулярным синдромом, тендовагинит, бурсит);
- болевого синдрома слабой или умеренной степени выраженности: невралгия, оссалгия, миалгия, люмбоишиалгия, посттравматический болевой синдром (растяжения и ушибы), сопровождающийся воспалением, головная боль, мигрень, альгодисменорея, зубная боль;
- в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа с выраженным болевым синдромом (фарингит, тонзиллит, отит);
- лихорадочного синдрома при «простудных» и инфекционных заболеваниях.

Препарат Налгезин применяется для симптоматической терапии (для уменьшения боли, воспаления и снижения повышенной температуры тела) и на прогрессирование основного заболевания не влияет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

Способ действия препарата Налгезин

Препарат обладает обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Препарат Налгезин снижает активность фермента циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-1, ЦОГ-2).

Препарат Налгезин хорошо растворяется, быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и обеспечивает быстрое наступление обезболивающего эффекта.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Налгезин

Противопоказания

Не принимайте препарат Налгезин:

- если у Вас аллергия на напроксен или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (в том числе было когда-либо ранее);
- если Вам недавно выполнили аортокоронарное шунтирование;
- если у Вас эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение;
- если у Вас воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) в фазе обострения;
- если у Вас гемофилия и другие нарушения свертываемости крови и нарушения гемостаза;
- если у Вас внутричерепное (цереброваскулярное) кровотечение или иные кровотечения;
- если у Вас декомпенсированная сердечная недостаточность;
- если у Вас тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени;
- если у Вас тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия (повышение уровня калия в крови);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- если Вы младше 15 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Не превышайте доз, указанных в листке-вкладыше.

Для снижения риска развития нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта принимайте минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.

Если боль и лихорадка сохраняются или становятся сильнее, обратитесь к врачу.

Если у Вас бронхиальная астма, нарушения свертываемости крови, а также повышенная чувствительность к другим обезболивающим препаратам, перед приемом препарата Налгезин обратитесь к врачу.

С осторожностью принимайте препарат при заболеваниях печени и почечной недостаточности. При наличии почечной недостаточности врач будет контролировать показатель функции почек – клиренс креатинина. При клиренсе креатинина менее 30 мл/мин применять препарат Налгезин не рекомендуется. При хроническом алкогольном и других

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

формах цирроза печени концентрация несвязанного напроксена в крови повышается, поэтому в таких случаях рекомендуется применение более низких доз. После двух недель приема препарата лечащий врач назначит анализы крови для определения функции печени.

Не принимайте препарат Налгезин вместе с другими противовоспалительными и болеутоляющими препаратами, за исключением назначений врача.

Если Вам 65 лет и более (пожилой возраст), рекомендуется принимать более низкие дозы препарата.

Избегайте приема препарата Налгезин в течение 48 часов до хирургического вмешательства.

При необходимости определения 17-кортикостероидов прекратите прием препарата за 48 часов до исследования. Аналогично напроксен может оказывать влияние на определение 5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче.

Сообщалось о развитии тяжелых кожных реакциях, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, лекарственную реакцию в сочетании с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), связанных с применением препарата Налгезин. Прекратите прием препарата Налгезин и немедленно обратитесь к врачу, если Вы заметили какие-либо признаки, указывающие на эти тяжелые кожные реакции, описанные в разделе 4 листка-вкладыша.

Дети и подростки

Препарат Налгезин не предназначен для применения у детей и подростков в возрасте до 15 лет.

Другие препараты и препарат Налгезин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

В частности, сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете:

- антацидные препараты, содержащие магний и алюминий. Такие препараты уменьшают всасывание напроксена, что может снижать его эффективность;
- антикоагулянты (препараты, уменьшающие свертываемость крови, например, варфарин, гепарин и другие). Нестероидные противовоспалительные препараты могут усиливать действие антикоагулянтов и увеличивать время кровотечения;
- антитромбоцитарные препараты (например, клопидогрел или ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (например, флуоксетин или циталопрам). Совместное применение с напроксеном может увеличить риск развития желудочно-кишечного кровотечения;
- ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные препараты, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (например, целекоксиб). Совместное применение препарата Налгезин и других нестероидных противовоспалительных препаратов повышает риск возникновения нежелательных реакций;
- зидовудин (противовирусный препарат). Напроксен увеличивает концентрацию зидовудина в крови при одновременном применении;
- метотрексат (иммуносупрессант), фенитоин (противосудорожное средство) или сульфаниламиды (противомикробное средство). Напроксен замедляет выведение метотрексата, фенитоина, сульфаниламидов, увеличивая риск развития их токсического действия;
- мифепристон (препарат, используемый для прерывания беременности). Прием препарата Налгезин, как и других нестероидных противовоспалительных препаратов, в течение 8–12 дней после применения мифепристона не рекомендуется;
- диуретики (мочегонные препараты), например, фуросемид. Препарат Налгезин, как и

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

другие нестероидные противовоспалительные препараты, может уменьшать мочегонное действие диуретиков. Диуретики могут повышать риск повреждения почек (нефротоксичность) на фоне применения нестероидных противовоспалительных препаратов;

- препараты, которые связываются в значительной степени с белками плазмы крови (гидантоины, антикоагулянты и другие). Напроксен может снижать связывание этих препаратов с белками плазмы крови и повышать риск передозировки;
- препараты, подавляющие активность иммунной системы (иммуносупрессанты), например, такролимус или циклоспорин. Одновременное применение препарата Налгезин, как и других нестероидных противовоспалительных препаратов, и иммуносупрессантов повышает риск нефротоксичности или почечной недостаточности;
- препараты, снижающие артериальное давление (пропранолол и другие бета-адреноблокаторы). Препарат Налгезин может уменьшать активность таких препаратов; препарат Налгезин может увеличивать риск развития почечной недостаточности, связанной с применением ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.
- препараты, угнетающие кроветворение. Такие препараты могут усиливать проявления негативного влияния на клеточный состав крови (гематотоксичности) препарата Налгезин;
- пробенецид (для лечения подагры), который увеличивает концентрацию напроксена в крови;
- соли лития. Напроксен снижает выведение лития, что приводит к увеличению его концентрации в крови;
- кортикостероиды (гормоны) – одновременное применение нестероидных противовоспалительных препаратов и кортикостероидов может увеличивать риск образования язвы или желудочно-кишечного кровотечения.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, или предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат Налгезин противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Беременность

Не принимайте препарат Налгезин при беременности.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Налгезин в период грудного вскармливания.

Фертильность

Применение препарата Налгезин, как и других препаратов, блокирующих синтез простагландинов, может влиять на фертильность, поэтому его применение не рекомендуется женщинам, планирующим беременность.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Налгезин замедляет скорость реакции. Это следует учитывать при управлении транспортными средствами и работе с механизмами и выполнении задач, требующих повышенного внимания.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

Препарат Налгезин содержит натрий

Данный лекарственный препарат содержит 25 мг натрия (основной компонент пищевой соли) в каждой таблетке. Это эквивалентно 1,25 % от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей.

3. Прием препарата Налгезин

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Обычно суточная доза, применяемая для облегчения боли, составляет 2–3 таблетки (550–825 мг). Максимальная суточная доза – 3 таблетки (825 мг).

При применении препарата Налгезин в качестве жаропонижающего средства начальная доза составляет 2 таблетки, далее принимается по 1 таблетке (275 мг) каждые 8 часов.

Для предупреждения и лечения приступов мигрени начальная рекомендуемая доза составляет 2 таблетки (550 мг), при необходимости можно принимать по 1 таблетке (275 мг) каждые 8–12 часов. Максимальная суточная доза – 3 таблетки (825 мг).

Для облегчения менструальных болей и спазмов, болей после введения внутриматочных спиралей и других гинекологических болей рекомендуется назначение препарата в начальной дозе, составляющей 2 таблетки (550 мг), далее по 1 таблетке (275 мг) каждые 8 часов.

Для снижения риска развития нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта препарат следует принимать в минимальной эффективной дозе минимально возможным коротким курсом.

Пациенты пожилого возраста (≥ 65 лет)

Пациентам старше 65 лет следует принимать препарат по мере необходимости каждые 12 часов.

Применение у детей и подростков

Подростки в возрасте от 15 лет до 18 лет

Режим дозирования аналогичен режиму дозирования для взрослых.

Дети и подростки в возрасте до 15 лет

Не давайте препарат Налгезин детям и подросткам в возрасте до 15 лет.

Путь и (или) способ введения

Таблетки следует принимать внутрь с достаточным количеством воды.

Продолжительность лечения

Длительность применения – не более 5 дней.

Если Вы приняли препарата Налгезин больше, чем следовало

Незамедлительно проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Значительная передозировка напроксеном может характеризоваться сонливостью, диспептическими расстройствами (изжога, тошнота, рвота, боль в животе), слабостью, шумом в ушах, раздражительностью, в тяжелых случаях возможны кровавая рвота, черный дегтеобразный полужидкий стул с характерным неприятным запахом (мелена), нарушение

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

сознания, судороги и почечная недостаточность.

При приеме большого количества препарата Налгезин промойте желудок, примите активированный уголь. При необходимости врач назначит симптоматическое лечение: антациды, блокаторы Н2-рецепторов, ингибиторы протонной помпы. Гемодиализ неэффективен.

Если Вы забыли принять препарат Налгезин

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к Вашему лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Налгезин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Применение напроксена, как и других нестероидных противовоспалительных препаратов, может быть связано с небольшим увеличением риска возникновения артериальных тромбозов (например, инфаркт миокарда или инсульт).

При лечении нестероидными противовоспалительными препаратами сообщалось о появлении отеков и симптомов сердечной недостаточности, повышении артериального давления.

Прекратите прием препарата Налгезин и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появится любая из следующих серьезных нежелательных реакций – Вам может потребоваться неотложная медицинская помощь или госпитализация:

- развитие язвы, перфорации желудка и/или желудочно-кишечные кровотечения иногда со смертельным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста, кровавая рвота, мелена (черный полужидкий стул) (нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100);
- почечная недостаточность, почечный папиллярный некроз (нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100);
- рецидив или обострение язвенного колита или болезни Крона (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000);
- буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (сопровождается выраженной интоксикацией, сыпью и пузырями на коже) (очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000);
- распространенная сыпь, высокая температура тела, изменение лабораторных показателей крови (повышение активности «печеночных» ферментов, увеличение количества эозинофилов (эозинофилия)), увеличение лимфатических узлов и поражение внутренних органов (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами, также известная как DRESS-синдром) (частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно);
- характерная кожная аллергическая реакция, известная как фиксированная лекарственная сыпь, которая обычно повторяется на том же месте при повторном применении препарата и может выглядеть как круглые или овальные участки покраснения с отеком кожи, образованием пузырей (крапивницей, зудом) (частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно);
- асептический менингит (причинно-следственная связь с применением напроксена не установлена);
- ангионевротический отек (причинно-следственная связь с применением напроксена не установлена).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Налгезин

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

Сообщите лечащему врачу, если заметите любую из следующих нежелательных реакций:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- одышка;
- боль в животе;
- кожный зуд;
- запор;
- нарушение пищеварения (диспепсия);
- тошнота;
- диарея;
- вздутие живота (метеоризм);
- головокружение;
- сонливость;
- кожная сыпь;
- кровоизлияния в кожу (экхимозы);
- мелкие кровоизлияния в кожу (пурпура);
- нарушение зрения;
- нарушение слуха;
- шум в ушах;
- повышенное потоотделение;
- отечность;
- жажда;
- ощущение сердцебиения;
- стоматит.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- реакции повышенной чувствительности;
- воспаление легких с эозинофильными инфильтратами (эозинофильная пневмония);
- почечная недостаточность;
- нарушения работы почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит, нефротический синдром);
- появление крови в моче (гематурия);
- застойная сердечная недостаточность;
- рвота;
- повышенная чувствительность кожи к солнечному свету в виде покраснения, сыпи, зуда и волдырей (фотодерматозы);
- миалгия (боль в мышцах);
- пожелтение кожи и склер глаз (желтуха);
- снижение слуха;
- озноб и лихорадка (гипертермия);
- мышечная слабость;
- недомогание;
- депрессия;
- нарушения сна;
- бессонница;
- облысение (алопеция);
- нарушения менструального цикла;
- невозможность концентрироваться;
- повышение активности «печеночных» ферментов в крови;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

- повышение количества эозинофилов в крови (эозинофилия);
- снижение количества белых клеток крови (гранулоцитопения, лейкопения или тромбоцитопения).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- обострение воспалительных заболеваний кишечника (язвенного колита или болезни Крона);

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- гастрит.

Следующие нежелательные реакции возникали у людей, принимавших напроксен, но взаимосвязь данных нежелательных реакций с применением напроксена **не установлена**:

- крапивница;
- воспаление сосудов (васкулит);
- появление на коже пурпурных пятен или других высыпаний (мультиформная эритема);
- покраснение или воспаление кожи после воздействия солнечного света (реакции фоточувствительности, подобные поздней кожной порфирии и буллезному эпидермолизу);
- снижение памяти, внимания, концентрации (когнитивная дисфункция);
- низкая концентрация сахара в крови (гипогликемия);
- снижение количества эритроцитов и гемоглобина за счет угнетения костного мозга или разрушения эритроцитов (апластическая и гемолитическая анемия);
- высокая концентрация сахара в крови (гипергликемия).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru

Республика Беларусь
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а
Телефон: +375 (17) 242 00 29
Факс: +375 (17) 242 00 29
Адрес электронной почты: rcpl@rceth.by
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.rceth.by

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
010000, г. Астана, район Байконыр, ул. А. Иманова, д. 13, БЦ «Нурсаулет 2»
Телефон: +7 7172 235 135
Адрес электронной почты: farm@dari.kz

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.ndda.kz

Республика Армения
ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»
0051, г. Ереван, пр. Комитаса, д. 49/5
Телефон: (+374 10) 20 05 05, (+374 96) 22 05 05
Адрес электронной почты: vigilance@pharm.am
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://pharm.am

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий
720044, Чуйская область, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25
Телефон: +996 (312) 21 92 86
Адрес электронной почты: pharm@dlsmi.kg
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.dlsmi.kg

5. Хранение препарата Налгезин

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (блистер в пачке картонной).

Не выбрасывайте препараты в канализацию (водопровод). Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Налгезин содержит

Действующим веществом является напроксен.

Каждая таблетка содержит 275 мг напроксена натрия.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: повидон К30, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, вода очищенная, Опадрай YS-1R-4215 (гипромеллоза, титана диоксид (Е171), макрогол, краситель индигокармин (Е132)).

Препарат Налгезин содержит натрий (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Внешний вид препарата Налгезин и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета.

По 10 таблеток в блистере из ПВХ/алюминиевой фольги.

По 1 или 2 блистера в пачке картонной вместе с листком-вкладышем.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска «без рецепта».

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Словения / Slovenia

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.02.2026 № 3172
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0026)

АО «КРКА, д.д., Ново место» / KRKA, d.d., Novo mesto
Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место / Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «КРКА-РУС»
143500, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 50
Телефон: +7 (495) 994 70 70
Факс: +7 (495) 994 70 78
Адрес электронной почты: krka-rus@krka.biz

Республика Беларусь
Представительство Акционерного общества «KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto» (Республика Словения) в Республике Беларусь
220114, г. Минск, ул. Филимонова, д. 25Г, офис 315
Телефон: 8 740 740 9230
Факс: 8 740 740 9230
Адрес электронной почты: info.by@krka.biz

Республика Казахстан
ТОО «КРКА Казахстан»
050040, г. Алматы, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, офис 601
Телефон: +7 (727) 311 08 09
Адрес электронной почты: info.kz@krka.biz

Республика Армения
Представительство «Крка, д.д., Ново место» в Республике Армения
0001, г. Ереван, ул. Налбандян, д. 106/1 («САЯТ-НОВА» БИЗНЕС-ЦЕНТР), офис 103
Телефон: +374 11 560011
Адрес электронной почты: info.am@krka.biz

Кыргызская Республика
Представительство АО «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место» в Кыргызстане
720040, Чуйская область, г. Бишкек, бульвар Эркиндик, д. 71, блок А
Телефон: +996 (312) 66 22 50
Адрес электронной почты: info.kg@krka.biz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Листок-вкладыш доступен на всех языках государств – членов Евразийского экономического союза в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) Евразийского экономического союза https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).