


**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель директора  
Департамента лекарственных  
средств и медицинских изделий при  
Министерстве здравоохранения  
Кыргызской Республики  
Кысанов Т.А.   
«05» мая 2024 г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

### СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ

#### **Торговое наименование**

Септолете® тотал

**Международное непатентованное наименование или группировочное наименование**  
Бензидамин и цетилпиридиния хлорид

#### **Лекарственная форма**

Таблетки для рассасывания (лимон и мед)

#### **Состав**

1 таблетка для рассасывания содержит:

*Действующие вещества:*

Бензидамина гидрохлорид 3 мг и цетилпиридиния хлорида моногидрат 1,05 мг  
(эквивалентно цетилпиридиния хлориду 1 мг).

*Вспомогательные вещества:* изомальт (тип М) (E953), лимонная кислота (E330),  
ароматизатор медовый, сукралоза (E955), ароматизатор лимонный, левоментол, краситель  
куркумин (E100), мяты перечной листьев масло.

#### **Описание**

Таблетки для рассасывания: круглые таблетки со скошенными краями, с шероховатой поверхностью от светло-желтого до желтого цвета. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения респираторной системы. Препараты для лечения заболеваний горла. Другие препараты для лечения горла. Бензидамин.  
Код АТХ: R02AX03

#### **Фармакологические свойства**

##### **Фармакодинамика**

Бензидамин – нестероидное противовоспалительное средство, обладающее противовоспалительным, обезболивающим и местноанестезирующим действием. Цетилпиридиния хлорид – антисептик из группы четвертичных аммониевых соединений, оказывает противомикробное, противогрибковое, вирулицидное действие против некоторых вирусов с оболочкой (например, вирусов гриппа, респираторно-синцитиального

вируса, корона вирусов, и т. д.). Таблетки для рассасывания Септолете® тотал лимон и мед показали вирулицидное действие против тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного корона вирусом 2 (SARS-CoV-2), разрушая вирусную оболочку и инактивируя вирус. Таблетки для рассасывания Септолете® тотал лимон и мед уменьшили количество вирусов более чем на 99,9% в течение 5 минут при исследовании *in vitro*.

### **Фармакокинетика**

#### **Всасывание**

Из двух действующих веществ – цетилпиридиния хлорид и бензидамин – через слизистые оболочки всасывается только бензидамин. Поэтому цетилпиридиния хлорид не вступает в фармакокинетическое взаимодействие с бензидамином на системном уровне. Всасывание бензидамина через слизистые оболочки полости рта и глотки было показано посредством выявления действующего вещества в сыворотке крови, количество которого, тем не менее, было недостаточно для оказания системного действия. Всасывание бензидамина выше при применении лекарственных форм, которые растворяются в полости рта в сравнении с лекарственными формами для местного применения (например, спрей для полости рта).

#### **Распределение**

Объем распределения всех лекарственных форм одинаков.

#### **Выведение**

Выведение происходит в основном почками, в большей степени, в форме неактивных метаболитов. Период полувыведения и общий клиренс сходны для всех лекарственных форм.

### **Показания к применению**

Препарат Септолете® тотал лимон и мед таблетки для рассасывания показан взрослым в качестве противовоспалительного, обезболивающего и антисептического средства при раздражении горла, полости рта и десен, гингивита, фарингита и ларингита, а также для применения до и после удаления зубов.

### **Режим дозирования и способ применения**

Таблетки следует медленно рассасывать во рту каждые 3-6 часов.

*Взрослые, пациенты пожилого возраста и дети старше 12 лет*

Рекомендованная доза составляет 3-4 таблетки в сутки.

*Дети от 6 до 12 лет*

Рекомендованная доза составляет 3 таблетки в сутки.

Не следует превышать указанную дозу.

Для достижения оптимального эффекта не следует применять препарат Септолете® тотал лимон и мед непосредственно до или после чистки зубов.

Препарат Септолете® тотал лимон и мед не следует применять более 7 дней.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к действующим веществам, либо к какому-либо из вспомогательных веществ.

Детский возраст до 6 лет.

### **С осторожностью**

Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам, бронхиальная астма (в т. ч. в анамнезе).

### **Нежелательные реакции**

Классификация частоты развития побочных эффектов, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

очень часто	$\geq 1/10$
часто	от $\geq 1/100$ до $< 1/10$
нечасто	от $\geq 1/1000$ до $< 1/100$
редко	от $\geq 1/10000$ до $< 1/1000$
очень редко	$< 1/10000$

частота неизвестна: не может быть оценена на основе имеющихся данных.

*Нарушения со стороны иммунной системы:*

частота неизвестна: анафилактические реакции, реакции повышенной чувствительности.

*Нарушения со стороны нервной системы:*

частота неизвестна: онемение слизистой оболочки полости рта.

*Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения:*

редко: бронхоспазм.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:*

очень редко: раздражение слизистой оболочки полости рта, чувство жжения в полости рта.

*Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:*

редко: крапивница, фотосенсибилизация;

частота неизвестна: ангионевротический отек, кожный зуд.

### **Особые указания и меры предосторожности при применении**

Препарат Септолете® тотал лимон и мед не следует применять более 7 дней. При отсутствии заметных признаков улучшения состояния следует обратиться к врачу.

При применении препарата Септолете® тотал лимон и мед возможно развитие реакций гиперчувствительности. В этом случае рекомендуется прекратить лечение и проконсультироваться с врачом для назначения соответствующей терапии.

При наличии язвенного поражения слизистой оболочки ротоглотки, пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются в течение более трех дней.

Применение препарата Септолете® тотал лимон и мед не рекомендуется у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам.

Препарат Септолете® тотал лимон и мед не следует применять одновременно с анионными соединениями (например, присутствуют в зубной пасте). Поэтому не рекомендуется применение препарата непосредственно до или после чистки зубов.

Одновременный прием с молоком может снизить противомикробное действие цетилпиридиния хлорида, поэтому препарат Септолете® тотал лимон и мед не следует применять одновременно с молоком.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата Септолете® тотал лимон и мед при беременности и в период грудного вскармливания возможно только под наблюдением врача.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат Септолете® тотал лимон и мед не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и работу с механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Следует избегать одновременного применения с другими препаратами из группы антисептиков.

### **Передозировка**

*Симптомы:* токсические проявления передозировки бензидамина включают: возбуждение, судороги, повышенное потоотделение, атаксию, озноб и рвоту. Признаки и симптомы

интоксикации при приеме внутрь значительных количеств цетилпиридиния хлорида: тошнота, рвота, отек, цианоз, асфиксия с последующим параличом дыхательных мышц, угнетение центральной нервной системы, артериальная гипотензия и кома. Смертельная доза для человека составляет около 1-3 г.

*Лечение:* ввиду отсутствия специфического антидота, лечение острой интоксикации бензидамином симптоматическое. Лечение передозировки цетилпиридиния хлорида также симптоматическое. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.

#### **Срок годности**

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от света.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Форма выпуска и упаковка**

Таблетки для рассасывания.

По 8 таблеток в блистере из ПВХ/ПЭ/ПВДХ фольги и алюминиевой фольги.

По 2 или 3 блистера помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель**

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

#### **Упаковщик**

КРКА, д.д., Улица Рада Пушеняка 10, 9240 Лютомер, Словения

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Кыргызской Республики:**

Офис представительства КРКА, д.д., Кыргызская Республика, г. Бишкек

Телефон: +(996) 312 662 250

Электронная почта: [pharmacovigilance.KG@krka.biz](mailto:pharmacovigilance.KG@krka.biz)